

PREGUNTA 165

La causa MÁS FRECUENTE de fístulas vesicovaginales es:

1. La cirugía ginecológica.
2. El parto.
3. El cáncer de cuello de útero o vagina.
4. La radioterapia de los cánceres ginecológicos.

Se adjunta texto de la S.E.G.O. en cual se diferencia la etiología de las fístulas vesico-vaginales en función del desarrollo del país sin mencionar la frecuencia global, junto con la publicación de la archivos Españoles de Urología <http://aeurologia.com/pdfs/articulos/2436679862731-eng.pdf>, en la que sí define la causa mundial.

Bibliografía:

<http://aeurologia.com/pdfs/articulos/2436679862731-eng.pdf>



proSEGO
www.prosego.com

Suelo pélvico

Fístulas urinarias

Guía práctica de asistencia publicada en 2006

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se entiende por fístulas urinarias la comunicación anómala de las vías urinarias a cualquiera de sus niveles con otras estructuras huecas. Se distinguen diferentes tipos: uretro-vaginal, vésico-vaginal, urétero-vaginal y vésico-uterina.

Este tipo de fístulas son frecuentes en países en vías de desarrollo y se deben fundamentalmente a complicaciones obstétricas. Las derivadas de cirugía ginecológica y de tratamientos radioterápicos son más frecuentes en países desarrollados.